

# Noto PLUS

# 6



広報のと  
第196号

令和3年6月1日発行

発行：能登町 編集：総務課  
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町宇田津下字50番地1

TEL: 0768-62-10000  
能登町 URL: <https://www.town.noto.lg.jp>  
Eメール: [info@town.noto.lg.jp](mailto:info@town.noto.lg.jp)



おいしいお米が  
実りますように

(柳田小学校 田植え体験・5月12日)

掲載している行事などは、中止・延期となる場合があります。  
事前にお問い合わせいただくか、ホームページなどにより最新の情報をご確認ください。

## 新型コロナワクチンを受けた後の注意点

能登町では、65歳以上の方から順にファイザー社のワクチン接種を行っています。65歳から74歳の方には5月下旬に接種券を送付しています。当面は、確保できるワクチンの量に限りがあるため、供給量に応じて重症化リスクの高い方から順に接種のご案内をしています。

ワクチンの接種後、じんましんや腹痛、息苦しさなどのアナフィラキシーや、立ちくらみなどの血管迷走神経反射が起こる可能性があるため、すぐに対応できる接種会場や医療機関で様子を見ましょう。

### ワクチンを受けた後は、 15分以上は接種会場で 座って様子を見てください。

※過去にアナフィラキシーを含む、重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、採血等で気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある方は、30分ほどお待ちください。



ワクチンを受けた後も、マスクの着用など感染予防対策の継続をお願いします。

### ワクチンを受けた日は

- 激しい運動は控えてください。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。
- 接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。



### ■ワクチンの接種後、数日以内に現れる可能性のある症状

発現割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10%～50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1%～10%	吐き気、嘔吐

- インフルエンザ等のワクチンより痛みが強いと感じる方もいます。
- これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
- 疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の接種の方が、頻度が高くなる症状もあります。

接種後に、からだに異常があるときは、ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センターに相談ください。

### 能登町新型コロナワクチン 接種コールセンター

☎ 62-2567 平日 9:00～17:00

- ・接種開始時期、接種時間、送迎バスなど、一般的なお問い合わせ
- ・接種のキャンセル など

### 副反応などの医学的なご相談

- ◆石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター  
☎ 0120-540-004 (無休 9:00～21:00)  
※発熱患者等の受診相談は24時間対応

### ワクチンに関するご相談

- ◆厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンコールセンター  
☎ 0120-761-770 (無休 9:00～21:00)



「広報のと」6月号の印刷費は一部当たり 33.4円です。



この印刷物は、E3PAのゴールドプラス基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています。  
E3PA：環境保護印刷推進協議会

環境保護印刷  
PIN No.P13-0179  
環境保護印刷：クリオネマーク認証