



# Noto

PLUS

8

うわー、高いなあ  
かっこいいなあ

(しらねぎ保育所 建設機械乗車体験)



掲載している行事などは、中止・延期となる場合があります。  
事前にお問い合わせいただくか、ホームページなどにより最新の情報をご確認ください。

## 新型コロナワクチンの効果と副反応

### 新型コロナワクチンの効果

現在、国内で承認され新型コロナワクチン接種に使用しているのは、ファイザー社、モデルナ社が開発した mRNA (メッセンジャー RNA) ワクチンです。

新型コロナで使用している mRNA ワクチンは、新しいワクチンですが、インフルエンザウイルスなど他のウイルスの mRNA ワクチンは何十年も前から研究されていて、長期的な副反応は認められていません。

ファイザー社製の mRNA ワクチンを世界でも率先して使用し、高い接種率を達成しているイスラエルでは、実際の感染予防効果、発症予防効果が研究され、報告されています。

### 接種した人が感染したときの症状

ワクチン接種をしても新型コロナウイルスの感染をゼロにできるわけではありません。ただし、研究報告によるとワクチン接種後に新型コロナウイルスに感染した人は、ワクチン未接種で感染した人と比べて、

- 排出するウイルスの量が少なく、排出する期間が短い
  - 無症候性感染者の割合が高い
  - 症状のある期間が短い
- ということが分かっており、重症化しにくく、周囲にも感染を広げにくいと考えられています。

	感染予防効果	発症予防効果
男性	91%	88%
女性	93%	96%
16～39歳	94%	99%
40～69歳	90%	90%
70歳以上	95%	98%
基礎疾患なし	91%	93%
基礎疾患1～2つ	95%	95%
基礎疾患3つ以上	86%	89%
肥満	95%	98%
2型糖尿病	91%	91%
高血圧	93%	95%

※イスラエルにおける研究報告

### ワクチン接種の副反応

新型コロナワクチンの副反応は、従来のインフルエンザワクチンなどと比べると、局所反応や全身反応の頻度は高いと言われています。

また、1回目よりも2回目の方が副反応の頻度が高くなりますが、いずれも接種後2日くらいまでにはほとんどの人で消失します。これとは別に、数十万人に1人の割合で、じんましん、吐き気、下痢、呼吸困難などのアナフィラキシーの副反応がみられることがあります。薬剤や食べ物のアレルギーのある方、アナフィラキシーを起こしたことがある方は、接種後30分は経過を見てから帰宅してください。

### ワクチン接種に関して、差別・偏見・いやがらせは許されません！

町では「高齢者」、「基礎疾患を有している方」を優先にワクチン接種をしています。

65歳以上の方は、7月末で約9割の方が2回目の接種が完了します。64歳以下の基礎疾患を有する方は、8月上旬に2回目の接種が完了する予定で、現在64歳以下の方を対象に順次接種しています。

このワクチン接種については強制ではなく、さまざまな事情で接種を受けることができない方もいます。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをすることのないようお願いします。

### 能登町新型コロナワクチン接種コールセンター

☎ 62-2567 平日 9:00～17:00

- ・接種開始時期、接種時間など、一般的なお問い合わせ
- ・接種のキャンセル など

### 副反応などの医学的なご相談

- ◆接種した医療機関や、かかりつけ医、お近くの医療機関
- ◆石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター  
☎ 0120-540-004 (無休 9:00～21:00)  
※発熱患者等の受診相談は24時間対応

### ワクチンに関するご相談

- ◆厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンコールセンター  
☎ 0120-761-770 (無休 9:00～21:00)

